

Olämpliga läkemedel för äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska finnas en välgrundad och aktuell orsak för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör även följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn ”Läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”. (Socialstyrelsen 2010-6-29). Följande läkemedel ingår i olämpliga läkemedel (september 2014):

Långverkande bensodiazepiner. Är lugnande och sömngivande läkemedel	Läkemedel med antikolinerga effekter (forts)
Diazepam Stesolid Apodorm Mogadon Nitrazepam Flunitrazepam	Egazil Emselex Kentera Ketogan Klomipramin Leponex Lergigan Levomepromazine Ludiomil Maprotilin Metylskopolamin Morfin-Skopolamin Nozinan Oxibutynin Oxikodon-hyoscin Oxybutynin Pargitan Proklorperazin Robinul Saroten Scopoderm Sensaval Spasmofen Theralen Tolterodin TOVIAZ Truxal Vesicare
Tramadol, mot smärta	
Gemadol Nobligan Tiparol Tradolan Tramadol	
Propiomazin. Används vid sömnbesvär.	
Propavan	
Läkemedel med antikolinerga effekter. Används till exempel vid urininkontinens, mot smärta och vid vissa ögonsjukdomar, astma, KOL och Parkinsons sjukdom	
Akineton Alimemazin Anafranil Atarax Atropin Buscopan Calma Clozapine Desentol Detrusitol Ditropan Durbis	