

2017-02-28

Regionala cancercentrum i samverkan

Svensk förening för allmänmedicin (Sfams) synpunkter på remissrunda 1 om Nationellt vårdprogram för njurcancer som ska rapporteras senast 1/3 2017.

Sfam anser att alla relevanta delar finns med och är väl beskrivna. Vi bifogar en tabell som bygger på brittisk primärvårdsdata, över positivt prediktivt värde för olika symtom och fynd vid njurcancer. Tyvärr finns inga motsvarande siffror på svenskt material. Faktan i tabellen kan möjligen vara intressant att ta med i det Nationella vårdprogrammet för njurcancer.

PPV (%) för njurcancer, engelska män och kvinnor ≥ 60 år

Ryggvärk	Förstopning	Cystit, nedre uvi	Trötthet	Illamående	Buksmärt	Förhöjda infl markörer	Trombocytos	Anemi (microcytosis)	Makrohematuri	NJURCANCER
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	1.0	PPV för enskilt symtom/riskmarkör
0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	Ryggvärk
	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6	1.0	Förstopning
			0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	Cystit, nedre uvi
			0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.9	Trötthet
				0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	1.1	Illamående
					0.2	0.2	0.5	>5	2.8	Buksmärt
							0.4	0.7	1.3	Förhöjda infl markörer
								0.6	2.1	Trombocytos (>400)
									1.5	Anemi (microcytosis)
									1.2	Makroskopisk hematuri

Shephard E, Neal R, Rose P, Walter F, Hamilton WT. Clinical features of kidney cancer in primary care: a case-control study using primary care records. Br J Gen Pract. 2013;63:e250-5.

För Svensk förening för allmänmedicin

Hans Thulesius
Spec i allmänmedicin
Ordf forskningsrådet Sfam

Anna Nager
Spec i allmänmedicin
Vetenskaplig sekreterare Sfam